

NOMBRE DEL PROTOCOLO	ESPECIALI DAD	INVESTIGA DOR PRINCIPAL
Prevalencia de cáncer de mama familiar y hereditario en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas	<b>GENT - PAT</b>	Dr. Abelardo Arias
Atribución del cáncer en pacientes con cáncer de cuello uterino y de mama	<b>PSIC</b>	Pscol. Franco Granthan
Nivel de conocimientos y actitudes de las enfermeras frente al dolor en pacientes post-operados en el Servicio de Cirugía 5"E" del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.	<b>ENF</b>	Lic. Corina Mamani
Diseño y evaluación del beneficio dosimétrico de un espirómetro Pitot computarizado en el tratamiento de cáncer de Pulmón con Radioterapia asistida a la respiración. (RAR)	<b>RT</b>	Dr. Alberto Lachos
Autopercepción de la imagen corporal en pacientes sometidas a histerectomía radical en el Servicio de Cirugía del 5to Piso Este del INEN durante el periodo Noviembre- Diciembre 2006	<b>ENF</b>	Lic. Carmen Castro
Satisfacción marital en mujeres con cáncer cervical y sus parejas.	<b>PSIC</b>	Psicol. María del Pilar Araníbar

<p>Estudio fase II de la temozolomida (SCH523635) en sujetos con cáncer avanzado de las vías respiratorias y el tracto digestivo superior seleccionados en función de la mutación del promotor de la O6metil-guanina -ADN metiltransferasa (MGTM)</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Carlos Carracedo</p>
<p>Calidad de vida en pacientes mujeres mastectomizados adulto joven y adulto del INEN</p>	<p><b>PSIC</b></p>	<p>Psic. Keith Rojas</p>
<p>Ensayo en fase III de vinflunina más gencitabina frente a paclitaxel mas gencitabina en pacientes con cáncer de mama irreseccable, localmente recurrente o metastásico tras quimioterapia adyuvante previa basada en antraciclinas.</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Henry Gómez</p>
<p>Estudio comparativo del desempeño laboral del personal de enfermería del INEN a través de un sistema de indicadores vs el sistema tradicional del MINSA</p>	<p><b>ENF</b></p>	<p>Lic. Vilma Lavado</p>
<p>Niveles de autoestima en pacientes mastectomizadas y nomastectomizadas.</p>	<p><b>PSIC</b></p>	<p>Psicol. Carla Barraza</p>
<p>Indicadores psicopatológicos durante el tratamiento oncológico en adolescentes hospitalizados y no hospitalizados del INEN.</p>	<p><b>PSIC</b></p>	<p>Psicol. Daniela Ipince</p>

Percepción que tienen los pacientes con Leucemia acerca de la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario(UTM)	<b>ENF</b>	Lic. Eunisa Ramos
Nivel de ansiedad en pacientes mastectomizadas portadoras de drenaje Hemoback del V Piso E	<b>PSIC</b>	Lic. Rocio Tocasca
Detección molecular de CK19 en sangre periférica como factor pronóstico en cáncer de mama temprano	<b>MED</b>	Dra. Shirley Quintana
Estudio de fase II en pacientes con cáncer gástrico localmente avanzado o adenocarcinoma gástrico localmente avanzado o adenocarcinoma gastroesofágico tratado con inducción irinotecan/cisplatino, cirugía potencialmente curativa con adyuvancia intraperitoneal floxuridina/cisplatino seguido por capecitabina	<b>MED</b>	DR. JORGE LEON CHONG
Uso compasivo del AMN107 en un único paciente con leucemia mieloide crónica (LMC) positiva para cromosoma filadelfia (Ph+)resistente al imatinib en fase crónica	<b>MED</b>	Dr. César Samanez
Estudio abierto de acceso expandido de tratamiento con Lapatinib y capecitabina en sujetos con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con sobre-expresión de Erb2.	<b>MED</b>	Dr. Henry Gómez

<p>Estudio ALTTO (Estudio de optimización del tratamiento adyuvante con Lapatinib y/o Trantuzumab) Estudio distribuido aleatoriamente, multicéntrico, abierto, de fase III acerca de Lapatinib, Trastuzumab adyuvante, su secuencia y combinación, realizado con sujetos que padecen cáncer de mama primario" BIG 2-06/NO6D/EGF106708</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Henry Gómez</p>
<p>Estudio fase II de Cetuximab más Cisplatino, 5 Fluorouracilo y radiación en pacientes inmunocompetentes con carcinoma anal</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>DR. JORGE LEON CHONG</p>
<p>Una entrevista de los síntomas relacionados a la enfermedad y los relacionados al tratamiento en pacientes con cáncer invasivo de la mama, próstata, pulmón o colo/rectal.</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>DR. CARLOS VALLEJOS</p>
<p>Calidad de vida en pacientes mujeres mastectomizados adulto joven y adulto del INEN</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Luis Casanova</p>
<p>ahorro de recursps en los departamentos de radioterapia en el tratamiento de cancer de mama</p>	<p><b>RT</b></p>	<p>Dr. Alfredo Moscol</p>
<p>Determinación de la actividad citotóxica de los flavonoides de once especies del género Croton en líneas celulares de cáncer humano</p>	<p><b>FARM</b></p>	<p>Ruth Pumahuanca Yudith Bautista Tinco</p>

<p>Estudio de fase I/II no aleatorizado, de etiqueta abierta, para definir la dosis de Ispinesib (SB715992) seguido por un estudio de dosis fija en pacientes con cáncer de mama metastásico (MBC) sin quimioterapia previa</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Henry Gómez</p>
<p>Medidas antropométricas e índices nutricionales que influyen en la visualización del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama</p>	<p><b>MAMA</b></p>	<p>Cynthia Honorio Carrillo Cecilia López Valdivia</p>
<p>Efectividad de la técnica de anestesia total intravenosa (TIVA) en el control</p>	<p><b>ANEST</b></p>	<p>Dr. Juan Bailetti</p>
<p>Estudio randomizado fase II, de biomarcador empleando tratamiento secuencial neoadyuvante con AC seguido de Ixabepilona en comparación con tratamiento secuencial neoadyuvante con AC seguido de Paclitaxel, en mujeres con cáncer de mama temprano sin sobreexpresión de receptores de HER 2 y de estrógeno.</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Henry Gómez</p>
<p>Protocolo para el tratamiento de Histiocitosis de Células de Langerhans en pacientes menores de 15 años.</p>	<p><b>PED</b></p>	<p>Dr. Juan García</p>
<p>Protocolo para el tratamiento de tumores de la familia de Sarcoma de Ewing en pacientes menores de 15 años.</p>	<p><b>PED</b></p>	<p>Dr. Juan García</p>

<p>Protocolo de estudio clinico fase II: EFC10339. Estudio Internacional aleatorizado para evaluar la adición de Docetaxel a la combinación de Cisplatino-5Fluoruracilo (CF) vs. CF en el tratamiento de inducción de carcinoma nasofaríngeo (CNF) en niños y adolescentes.</p>	<p><b>PED</b></p>	<p>Dr. Antonio Wachtel</p>
<p>Fomentando el uso de Papanicolaous en las mujeres del Perú</p>		<p>Srta. Valiere Paz Soldan</p>
<p>Un estudio fase 1/2 de SKI-606 en Leucemias positivas al cromosoma Filadelfia</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. César Samanez Figari</p>
<p>B020904 "Un estudio fase III doble ciego aleatorio multicéntrico de Bevacizumab en combinación con Capecitabina y Cisplatino versus placebo en combinación con Capecitabina y Cisplatino, como tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer gástrico avanzado"</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr Luis Casanova</p>
<p>Protocolo clinico CA180056. Estudio abierto, randomizado, multicéntrico, de fase III de Dasatinib (SPRYCEL) vs dosis estándar de Imatinib (400mgs) en el tratamiento de pacientes con diagnóstico reciente de Leucemia Mieloide Crónica en fase crónica cromosoma Filadelfia positivo,</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr Luis Casanova</p>
<p>Protocolo clinico CA180088 Titulado "Estudio fase II de Dasatinib (BMS-354825) en cáncer de mama avanzado receptores de estrógeno /progesterona o Her2/neu positivo.</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Henry Gómez</p>
<p>Estudio prospectivo aleatorizado y controlado de Epi-Rad90-TM, sistema oftálmico para el tratamiento de la neovascularización coroidea subfoveolar asociada a degeneración macular de tipo húmedo asociado a la edad.</p>	<p><b>OFT</b></p>	<p>Dr. Luis O. Izquierdo V.</p>

<p>Un estudio distribuido aleatoriamente, multicéntrico, abierto de fase III, de Lapatinib, Trastuzumab y su combinación en neoadyuvancia más Paclitaxel en mujeres con cáncer de mama primario HER2/Erb B2 positivo (NEO-ALTTO) BIG 1-06/EGF106903</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Henry Gómez Moreno</p>
<p>Un estudio aleatorizado multicéntrico, fase III para comparar la combinación de Pazopanib y Lapatinib versus la monoterapia de Lapatinib en pacientes con Cáncer de Mama Inflamatorio con sobre-expresión de ErbB2</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Henry Gómez Moreno</p>
<p>Protocolo clínico CA180188 titulado "Dasatinib en sujetos con Leucemia Mieloide Crónica o Leucemia Linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia positivo que experimentaron beneficios clínicos en los protocolos START actuales (CA180-005 y CA 180-017: Seguridad a largo plazo y análisis de eficacia.</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Luis Casanova Márquez</p>
<p>Predicción de respuesta y toxicidad en pacientes que reciben Paclitaxel y Avastin para el cáncer de mama: Un estudio correlativo, multicéntrico, genómico, proteómico y farmacogenómico.</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Henry Gómez Moreno</p>
<p>Protocolo para el tratamiento multidisciplinario de Retinoblastoma en pacientes menores de 15 años</p>	<p><b>PED</b></p>	<p>Dra. Clara Pérez</p>
<p>Tratamiento multidisciplinario de Hepatoblastoma y Hepatocarcinoma en pacientes menores de 15 años.</p>	<p><b>PED</b></p>	<p>Dra. Clara Pérez</p>
<p>Evaluación del estado anestésico mediante la asociación Midazolam-Remifentanilo en Cirugía Radical Oncológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2007.</p>	<p><b>ANEST</b></p>	<p>Dra. Violeta Escalante Tresierra</p>

Percepción del paciente adolescente con leucemia sobre su calidad de vida en el Instituto Nacional del Enfermedades Neoplásicas 2007.	<b>ENF</b>	Gisela Vázquez Yovera
Protocolo WSA-CS-004 Estudio de fase III, doble ciego, randomizado, para evaluar la seguridad y la eficacia de BAL8557 frente a voriconazol para el tratamiento primario de la enfermedad fúngica invasiva causada por especies <i>Aspergillus</i> u otros hongos filamentosos	<b>INFECT</b>	Dr. Luis Cuellar Ponce de León
Estudio para evaluar la seguridad y factibilidad de la radioterapia epirretiniana focal y Ranibizumab (Lucentis) para el tratamiento de la neovascularización coroidea (NVC) subfoveal secundaria a la degeneración macular asociada a la edad (DMAE)	<b>OFT</b>	Dr. Raúl Cordero G-Z.
Protocolo clínico Estudio de fase III, randomizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de 10 mg. De ZD4054 en combinación con Docetaxel en comparación con Docetaxel en pacientes con cáncer de próstata metastático hormona-persistente."	<b>MED</b>	Médico Silvia Neciosup D.
Protocolo H6Q-MC-S057 "Estudio multicéntrico abierto, no comparativo, de Enzastaurin en pacientes con Linfomas Non Hodgkin"	<b>MED</b>	Dr. Luis Casanova
MK-0646-004 " Un estudio de fase II-III del tratamiento con MK-0646 en combinación con Cetuximab e Irinotecan para pacientes con Cáncer Colorrectal metastásico	<b>MED</b>	DR. JORGE LEON CHONG

<p>Protocolo KF5503/16 R331333-PAI-3014 Estudio de retiro aleatorizado controlado placebo y control activo, doble ciego múlticentrico de fase III para evaluar la seguridad y eficacia de CG5503 PL administrado por vía oral en sujetos con dolor moderado a severo relacionado con tumores malignos</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Victor Castro</p>
<p>Un estudio de fase III , Randomizado en doble ciego, controlado con comparador activo, de grupo paralelo, realizado en condiciones de ciego interno, para examinar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de una dosis única de MK-0517 intravenoso para la prevención de las náuseas y vómitos inducidos por Quimioterapia (CINV) asociados con la Quimioterapia con Cisplatino"</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Henry Gómez Moreno</p>
<p>Análisis molecular de BRCA 1 y BRCA 2 en pacientes peruanas con cáncer de mama del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.</p>	<p><b>MAMA</b></p>	<p>Dr. Julio Abugattas</p>
<p>Protocolo para tratamiento multidisciplinario de Linfoma de Hodgkin en pacientes menores de 15 años</p>	<p><b>PED</b></p>	<p>Dr. Antonio Wachtel</p>
<p>Protocolo A885 1009 Estudio de fase III "Ensayo Prospectivo Randomizado, que compara la eficacia de la Anidulafungina y el Voriconazol combinados con el Voriconazol solo en el tratamiento primario de Aspergilosis Pulmonar Invasiva probada o probable,</p>	<p><b>INFECT</b></p>	<p>Dr. Luis Cuellar Ponce de León</p>
<p>Diarrea por Clostridium Dificil</p>	<p><b>INFECT</b></p>	<p>Dr. Luis Cuellar Ponce de León</p>

<p>Estudio aleatorizado de fase III para comparar la combinación de Fluradabina, BBR 2778 (Pixantrona) y Rituximab (FP-R) con la combinación de Fluradabina y rituximab (F-R) en el tratamiento de pacientes con linfoma Non-Hodgkin indolente recurrente o refractario. "</p>	<p><b>MED</b></p>	<p>Dr. Luis Casanova M.</p>
<p>Evaluación de la concentración sérica de pepsinógeno como método de tamizaje para gastritis crónica atrófica y lesiones pre-malignas del cáncer gástrico en una población de alto riesgo de Lima-Metropolitana</p>	<p><b>ABD</b></p>	<p>Dr. Luis Pilco</p>